

# STRAVA PRO SNÍŽENÍ KYSELINY MOČOVÉ

Zvýšené množství kyseliny močové v krvi může být příčinou dny nebo ledvinových kamenů.

Dna je bolestivá forma kloubního zánětu. Vzniká hromaděním krystalů kyseliny močové kolem kloubů. Nemoc je dlouho bez příznaků, pak klouby zduří, začnou bolet a postupně dochází k jejich deformaci. Postiženy bývají drobné klouby nohou a rukou. Stav, kdy se objeví bolest, se nazývá dnavý záchvat. Vzniká po vydatném jídle, stresu nebo klepnutí do postiženého kloubu a může trvat i několik dní.

Ledvinové kameny vznikají při zvýšené koncentraci látek schopných tvořit krystaly v moči. Tedy například při vysokém obsahu kyseliny močové v malém množství moči, (mohou vznikat i z jiných látek). Projeví se obvykle bolestí až při průchodu kamene močovodem. Bolest může být velice silná (ledvinová kolika). Kámen může poranit nebo ucpat močové cesty.

- Asi třetina kyseliny močové v lidském těle vzniká odbouráváním látek zvaných puriny. Puriny se nacházejí v jídle a nápojích. Kyselina močová se z těla vylučuje močí.
- Součástí léčby dny a ledvinových kamenů, prevence vzniku dalších kamenů a dnavých záchvatů je strava, která snižuje hladinu kyseliny močové v krvi.

1

## Vyhýbejte se potravinám s vysokým obsahem purinů

- Vnitřnosti, maso (hlavně z mladých zvířat), masné výrobky a extrakty – maso stačí 2x týdně;
- Některé ryby a mořské plody: sardinky, ančovičky, makrela, treska, tuňák, slávky, mušle;
- Kakao a čokoláda;
- Alkohol: zejména lihoviny a pivo (alkohol brání vylučování kyseliny močové).



## 2

### Hodně pijte

- Cílem je 16 sklenic nápojů denně, z čehož nejméně polovinu tvoří voda. Nedoporučuje se silný černý čaj a alkohol.



## 3

### Snižte nadváhu

- Již samotné omezení kaloricky bohaté stravy snižuje výskyt dnavých záchvatů. Nadváha zvyšuje riziko vzniku ledvinových kamenů a zatěžuje klouby.



## 4

### Jezte doporučené potraviny

- **Zeleninu a ovoce:** podle posledního výzkumu nezvyšuje zelenina ani s vysokým obsahem purinů (špenát, květák, chřest, houby) riziko dnavých záchvatů. Čočka a hrášek, které mají střední obsah purinů, jsou důležitým zdrojem bílkovin. Zařaďte zeleninové a ovocné dny.
- **Mléčné výrobky a vejce:** jako zdroj bílkoviny namísto masa (nejlépe s nižším obsahem tuku).
- **Obiloviny:** pečivo, těstoviny, rýže, kukuřice, cereálie – nejlépe celozrnné.



## 5

### Využijte potraviny, které mohou snižovat hladinu kyseliny močové v krvi

- Vitamin C: snižuje hladinu kyseliny močové.
- Třešně (čerstvé/kompotované/sušené): mohou snižovat riziko dnavých záchvatů.
- Káva: střední konzumace může snižovat riziko dny.



SARS DAR 16111239

**Zdroj:** Mayo Clinic - Diseases and condition: Goat, Kidney stones.  
<http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions> (navštíveno 23.11.2016)

**ZENTIVA**  
SPOLEČNOST SKUPINY SANOFI